

HYPERmixvet®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁLLATGYÓGYÁSZATI CÉLRA

*Házikedvencek, sportlovak, haszonállatok, valamint vad- és egzotikus állatok részére
(KÜLSŐLEG HASZNÁLATOS, NEM PERORALIS KÉSZÍTMÉNY)*

A **HypermiXvet** a sebgyógyulás mindhárom fázisában hatékony segítséget nyújt. Sok esetben elhagyható a helyi antibiotikus kezelés, ill. a szisztémás antibiotikus kezelés időtartama is lerövidülhet. Alkalmazható bármely sérült bőrfelületre, nyálkahártyára, (száj, íny, végbélnyílás) valamint a külső hallójáratban is. Szabályozza a sebfelületen képződő váladék mennyiségét és minőségét, ideális nedves sebkezelést tesz lehetővé, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatással bír.

Használati mód

A sebbe került idegen testeket, necroticus szöveteket, pörköt lehetőség szerint mechanikusan el kell távolítani. A sérült felületeket steril fiziológiás sóoldattal kell megtisztítani, kerüljük az alkohol, jód, klórhexidin vagy hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszer használatát! A lemosást követően naponta 1-2 alkalommal valamelyik Hypermixvet készítménnyel kezeljük le a sebfelületet, amit érdemes utána fedőkötéssel védeni.

A felhasználás korlátai

A termék elhalt, valamint hiperkeratózisos bőr (pikkelysömör, bőrmegvastagodás, tyúkszem, stb.) esetében nem hatásos.

Ellenjavallat

A kezelt területen tilos a termékkel egyidejűleg más kenőcsöt vagy fertőtlenítőszer használni. A formulák nem megfelelő alkalmazása késleltetheti a szöveti reparációt, gátolva ezzel a gyógyulás folyamatát.

Figyelmeztetés

A termék hosszabb ideig történő alkalmazása a sérült felület környékén időleges szőrhullást okozhat. (A szőrtüszők nem sérülnek, nem halnak el, a szőr visszanő.)

Kerülje a fertőtlenítőszer használatát, mert károsan befolyásolják a sebgyógyulás folyamatát.

A terméket levegő és fény hatásának ne tegyük ki (használat után zárja vissza, és tárolja sötét helyen). Tárolás max. 40°C-on. A termék 16°C alatti hőmérsékleten tulajdonságainak megváltozása nélkül megszilárdul. Szilárd állapotban is használható, testmeleg hatására azonnal folyékonnyá válik. Ha szilárd állapotban nehéz aplikálni, állítsuk az üveget langyos vízbe! (Max. 40°C.)

Összetevőire való egyéni és/vagy allergiás túlérzékenység esetén ne alkalmazzuk tovább!

A használt gézt ne használjuk fel újra, a gézt és az üveget a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően semmisítsük meg! Gyermekektől elzárva tartandó.

Összetevők

Neemfa-kivonat, Hypericum perforatum (közönséges orbáncfű).

Csomagolási egység:

Olaj, 250 ml-es üvegben	100400V
Olaj, spray adagolás, 100 ml-es üvegben	100600V
100 ml-es gél spray adagolóval	100100SPV
Olaj, cseppentős 30 ml-es üvegben	10030CGV
10 x 10 cm-es átitatott gézlapok (vazelines) (20 db/dob.)	10020GVV
200 ml-es zselé téglében	100200VV

HASZNÁLAT ELŐTT AZ OLAJ FELRÁZANDÓ.

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő az ép csomagolású, előírásoknak megfelelően tárolt termékekre érvényes.

REV. 2013. november



Figyelem: Ne szennyezze a környezetét!



Figyelem: Olvassa el a használati utasítást!

e-mail: info@rimos.com - web site: www.rimos.com

Keloidok: A HypermiXvet használata javasolt lovak végtagsérüléseinél, a keloidok visszafejődése érdekében. Keloidok esetében tegyen a sebre HypermiXvettel bőven átitatott gézlapot, és öntapadó kötszerrel kösse be! Ne helyezzen vattát vagy más anyagot a sérülés és a kötés közé! A kötést naponta cserélni kell. A HypermiXvet nem fejt ki a hatását a be nem kötözött, szabadon hagyott sebek esetében. **5 napig tartó, állandó fedőkötéssel folytatott kezelés után megfigyelhető a keloid vastagságának - később spontán megszűnő - felületi vérvéssel kísért csökkenése.** Amennyiben a kötés véletlenül leessik, a hegesezés ismét erősödik, ekkor a felület ismételt kezelését haladéktalanul meg kell kezdeni.